

Fava

Vicia faba L.

Melonia



- **Pianta:** accrescimento determinato, alta in media 110 cm.
- **Stelo:** assenza di pigmentazione antocianica dello stelo.
- **Fogliame:** colore verde (media intensità); media increspatura delle foglie.
- **Fiore:** fioritura a 130 giorni circa dalla semina.
- **Baccello:** semi pendulo, lunghezza di circa 8-10 cm; lieve curvatura o assenza di curvatura; colore verde mediamente intenso; numero di ovuli 3-4.
- **Seme:** peso medio di 204-211 g, tegumento beige-verde, presenza di pigmentazione nera dell'ilo.
- **Epoca di maturazione:** a circa 190 giorni dalla semina.

Caratteristiche tecnologiche

Varietà senza particolari esigenze agronomiche. Si caratterizza per la resistenza alle malattie e allo stress idrico. La semina in rotazione al frumento duro consente di evitare la presenza delle orobanche.

Il seme è di grosse dimensioni (circa 207 g peso 100 semi) ma estremamente piatto (3-5 mm di spessore). Il tegumento (pari a 14,8 g/100 g) ha una buona lucentezza. A fine cottura i semi si presentano con il tegumento integro.

Storia e curiosità

Testi pubblicati tra l'800 e il '900 forniscono informazioni sulla diffusione della coltivazione della fava in Puglia. De Cesare (1859) riporta che le fave pugliesi erano di ottima qualità e elenca le tre tipologie all'epoca coltivate: a seme grande, mezzano e piccolo. Manicone (1806) e Longano (1790), elencando le produzioni agricole dei comuni della Capitanata, riportano che a San Paolo di Civitate e Apricena la coltivazione delle fave era secondo per importanza al grano e preponderante rispetto a tutti gli altri legumi. I dati del censimento agrario del 1929 e riportati nel Catasto Agrario confermano che la fava da seme era la leguminosa coltivata in misura maggiore nel comprensorio del "basso Fortore" e nella piana di Lesina. In particolare, nel 1929 furono coltivati a fave 504 ettari con una produzione di 2,500 quintali a San Paolo di Civitate, e 1267 ettari con una produzione di oltre 14,000 quintali ad Apricena.

Sinonimi/denominazione dialettale

Fava melong, fava muognian.



Ambito locale di riferimento

San Paolo di Civitate, Lesina, Apricena, Serracapriola, San Severo (FG).



>18

**RISCHIO DI
EROSIONE GENETICA
O ESTINZIONE**

9-18

< 9

17

Luogo di conservazione

- Istituto di Bioscienze e Biorisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari.



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AGRICOLTURA